

Chers futurs étudiants,

Vous avez été admis au Lycée Descartes : toute l'équipe pédagogique sera ravie de vous recevoir à la rentrée. Dans ce petit fascicule, vous trouverez les principales informations concernant votre future classe : organisation, attentes, déroulement de l'année. Nous vous encourageons à lire ce document qui regorge de conseils venant de vos futurs professeurs.

Les clés de la réussite en CPGE sont le travail et l'organisation. Si vous suivez les conseils de ce fascicule, vous aurez tous les outils pour démarrer l'année sur de bonnes bases. Il est important que vous preniez un peu de temps pour vous après votre baccalauréat, mais il est aussi important, pour une bonne réussite, de se préparer à l'entrée en CPGE.

Alors bonnes vacances et rendez-vous en septembre.

L'équipe pédagogique.

Mathématiques

Les disciplines scientifiques (sciences-physiques, chimies, mathématiques, SI) seront vos matières principales. Beaucoup de choses seront revues de la terminale surtout lors de la première période. Mais la façon de les aborder sera radicalement différente de ce que la plupart d'entre vous aura connu jusqu'ici.

Cependant, un des points essentiels qu'il faut acquérir rapidement sont les savoir-faire en calcul. Une grande différence apparaîtra dès le début de l'année entre les élèves sur la base de ces capacités en calcul : il faut notamment savoir poser, rédiger, à l'écrit, correctement un calcul et acquérir au fil de l'année de la rapidité.

Pour vous aider dans votre préparation, vous trouverez en fin de livret un ensemble d'exercices, allant jusqu'au niveau terminale S avec leur corrigé, que vous devriez savoir faire en arrivant le premier jour. Nous vous encourageons évidemment à chercher ces exercices pendant vos vacances. Une petite précision : la calculatrice ne sera que très très rarement autorisée lors des devoirs de mathématiques, comme lors des concours d'ailleurs. Donc vous devrez connaître vos formules, et notamment toutes les formules de trigonométrie, de puissance, sur les fonctions exponentielle et logarithme ($\exp(a+b) = \exp(a) \times \exp(b)...$) Si vous les connaissez en arrivant en septembre, ce sera toujours cela de moins à travailler pendant l'année. Il n'est pas utile de chercher à prendre de l'avance : consolider les bases de calcul du lycée est la priorité.

Sciences Physiques

La physique enseignée dans le supérieur est très différente de celle qui vous a été présentée au lycée. Votre principal problème en physique cette année sera, pour la plupart, votre niveau en mathématiques et plus spécifiquement en calcul.

Pour commencer du bon pied vous devriez arriver à la rentrée en maîtrisant la trigonométrie et les calculs d'intégrales et de dérivées. Ce sont deux outils de base du physicien et nous les utiliserons intensément dès la rentrée.

Sciences de l'Ingénieur

Les Sciences industrielles pour l'ingénieur sont une discipline complètement nouvelle pour la plupart d'entre vous. Il s'agit d'une matière vraiment transversale. Dès le début de l'année, nous mettrons en place des techniques et des méthodes qui demandent une bonne maîtrise des calculs mathématiques élémentaires. Les lois élémentaires de sciences physiques seront rapidement employées. Tout effort fourni pendant l'été dans ce sens se ressentira largement dans cette matière et vous permettra de concentrer votre apprentissage sur les notions propres à cette discipline. Au delà des aspects scientifiques, un niveau d'expression convenable (orthographe, grammaire, formulation des idées, etc.) est attendu. Un vocabulaire précis sera à acquérir rapidement pour obtenir dès le départ de très bons résultats. Certains documents pourront être fournis en langue anglaise. Ne négligez pas les langues !

Lettres

Le thème de l'année est « la force de vivre ». Les trois œuvres du programme sont :

- Svetlana Alexievitch, *La Supplication*, Edition J'ai lu
- Nietzsche, *Le Gai Savoir*, traduction Wotling, Edition GF
- Victor Hugo, *Les Contemplations*, Livres IV et V, édition libre

Il faut impérativement lire ces livres avant la rentrée, même deux fois serait encore mieux.

Une lecture efficace se fait crayon en main : faites un plan structuré de l'œuvre, préparez une fiche rapide

sur les personnages principaux et les thèmes, notez un maximum d'exemples pour préparer l'étude du thème.

Langues - Anglais

Deux aspects principaux que vous pouvez travailler seuls : la compréhension orale et la compréhension écrite.

Compréhension orale : Le site de la BBC est le plus adapté mais n'hésitez pas à varier les sources authentiques. <http://www.bbc.co.uk/learningenglish> avec soit Lingohack (des vidéos) ou News Report (des extraits audio). Ces deux séries sont authentiques et adaptées à vos besoins puisqu'elles fournissent des transcriptions qui vous permettent de vérifier l'étendue de votre compréhension. Je vous suggère de les écouter une fois sans prendre de notes, puis deux fois en en prenant. Prenez 5mn pour les réorganiser puis vérifiez-les avec les transcriptions. Tout film ou toute série doit être vu en VO évidemment, avec les sous-titres en français, voire mieux en anglais. *The Newsroom*, série américaine, porte sur des sujets variés et utiles dans la perspective de vos concours.

Compréhension écrite : Commencez par Vocabulaire, magazine didactisé et adapté à un niveau standard de fin de terminale. Les aides lexicales sont très utiles et vous simplifieront la tâche pour constituer des listes de vocabulaire. Vous trouverez des exemplaires dans les bibliothèques et médiathèques municipales. Méfiez-vous ils sont assez chers à la vente à l'unité. Pour ceux d'entre vous pour qui la lecture de la presse anglophone est déjà chose aisée, trouvez et empruntez des exemplaires des magazines *The Economist* ou *Time* en bibliothèque. Ou lisez en ligne des articles issus de *The Guardian* ou *The Daily Telegraph*, *The New York Times* ou *The Huffington Post*.

Quel que soit votre choix, lancez-vous avec des articles portant sur des sujets qui vous intéressent ou qui vous intriguent.

Autre stratégie possible, achetez un magazine par mois (juillet et août) et lisez autant d'articles qu'il vous sera possible.

Dans l'idéal, constituez des listes thématiques de vocabulaire et expressions utiles à partir de vos lectures et de vos écoutes. Vous les complèterez au fil des deux années de CPGE. Enfin, toute opportunité de vous exprimer en anglais doit être saisie du simple bavardage avec des touristes perdus et/ ou sympathiques à des possibilités de séjours dans des pays anglophones.

Informatique

L'enseignement en CPGE contient une partie d'informatique en tronc commun. Le programme parcourt les domaines de l'algorithmique, du calcul numérique et des bases de données, comme des parties plus techniques. Le langage utilisé est le langage Python. Comme cette matière est nouvelle pour la plupart des étudiants, tout sera repris de zéro. Il n'est donc pas nécessaire de particulièrement s'y préparer. Cependant, certains d'entre vous voudront peut-être se familiariser avec le langage. Nous utilisons au lycée l'éditeur Pyzo que l'on peut trouver dans sa version la plus récente ici : <http://www.pyzo.org/start.html>. Si vous n'y connaissez rien et que vous souhaitez vous y mettre, le site OpenClassRooms propose une bonne introduction au langage. Si vous avez déjà quelques notions de programmation, vous pouvez par exemple vous exercer sur les problèmes du projet Euler : <https://projecteuler.net/>

Langues - Allemand

Il semble nécessaire d'asseoir vos bases grammaticales à partir d'un ouvrage de référence. Grâce à un moteur de recherche, vous pouvez faire votre choix parmi les nombreuses grammaires allemandes proposées par les éditeurs. Il en va de même pour le vocabulaire allemand. A titre indicatif les éditions *Ellipses*, *Harrap's*, *Larousse* ou *Bordas* (entre autres) sont particulièrement performantes dans ces deux domaines (Laissez vous guider par le coût et la spécificité des ouvrages.)

Il est vital de ne pas perdre le contact avec la langue allemande authentique. Pour ce faire, consultez régulièrement les sites des grands organes de presse tels que celui du Frankfurter Allgemeine Zeitung <http://www.faz.de>, de Die Zeit <http://www.zeit.de> ou Die Welt <http://www.welt.de>. Il n'est pas obligatoire de lire les articles dans leur intégralité, mais de se faire une idée globale du traitement de l'information outre-Rhin (surtout sur des sujets que vous maîtrisez déjà grâce aux médias français.)

Enfin, le site de la seconde chaîne de télévision allemande, <http://www.zdf.de>, est riche en documentaires ayant trait à la science, la civilisation et l'histoire (consultez sa « Mediathek »), souvent accessibles linguistiquement. N'hésitez pas à vous divertir (tout en apprenant !) en suivant leurs nombreuses séries policières très efficaces et bien réalisées.

Langues - Espagnol

Il est important que les conjugaisons soient au point : les temps de l'indicatif doivent être sus, il faut

donc les revoir régulièrement. À côté de cela, vous devrez travailler la compréhension orale. Vous pouvez par exemple utiliser le site : <http://www.ver-taal.com> sur lequel vous trouverez des *Ejercicios de escucha* pour vous entraîner. Enfin, la compréhension de l'actualité, via la lecture de la presse, est importante dans l'optique des concours. Dans ce but, vous trouverez encore en ligne des articles de presse (El País, El Mundo). Vocabulaire, au format papier, est un bon début et sera facile à emmener sur votre lieu de vacances.

FICHE D'EXERCICES DE CALCULS.

Si vous avez des questions, voici mon adresse bourgoin.jc@wanadoo.fr

Exercice 1 Calculer de deux façons

$$A = \left(-\frac{2}{3} - \frac{4}{5} + 1\right) - \left(-\frac{4}{3} + \frac{2}{5} - 2\right) + \left(-2 + \frac{4}{5}\right)$$

- en calculant d'abord chaque parenthèse
- en supprimant les parenthèses et en regroupant les termes qui donnent un résultat simple.

Exercice 2

Calculer :

- $A = ((a - c) - (a - b)) - ((b - c) - (a + c))$
- $B = \left(1 - \left(\frac{3}{4} - \frac{2}{3}\right)\right) - \left(1 - \left(\frac{5}{3} - \frac{1}{4}\right)\right) - \left(1 - \left(\frac{4}{3} + \frac{3}{4}\right)\right)$.
- $C = \left(-1 + \frac{2}{5} + \frac{1}{4}\right) \times (-4)$
- $D = \left(\frac{4}{9} - \frac{11}{27}\right) \left(2 - \frac{4}{3}\right)$
- $E = \frac{3 - \frac{2}{5} + \frac{3}{4}}{2 + \frac{4}{5} - \frac{2}{3}}$

Exercice 3

Rappels : Pour tout $(a, b, c, d) \in \mathbb{C}^4$ avec $b \neq 0, c \neq 0$ et $d \neq 0$

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{ad}{bc} \quad \frac{\frac{a}{b}}{c} = \frac{a}{bc} \quad \frac{a}{\frac{b}{c}} = \frac{ac}{b}$$

Rédaction : Dans vos calculs, vous devez impérativement marquer en plus grand la barre de fraction principale et bien écrire le symbole = en face de cette barre de fraction.

Exprimer en une seule fraction :

$$A = \frac{1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{1 + \frac{1}{3}}}{1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{1 - \frac{1}{3}}} \quad B = \frac{1}{\frac{1}{a}} \quad C = \frac{\frac{1}{a}}{a} \quad D = \frac{1 + \frac{a}{b}}{\frac{b}{a}} \quad E = \frac{1 + \frac{a}{b}}{\frac{a}{b}} \quad F = \frac{1}{\frac{a+b}{a}} \quad G = \frac{1}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}$$

Exercice 4

Rappels :

Pour tout $(a, b) \in (\mathbb{R}^+)^2$,

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \quad (b \neq 0)$$

$$\sqrt{a^2} = a \text{ si } a \geq 0; \sqrt{a^2} = -a \text{ si } a \leq 0$$

$$(\sqrt{a})^2 = a$$

$$a \geq b \iff a^2 \geq b^2$$

Comparer les nombres suivants, sans utiliser la calculatrice :

$$3\sqrt{2} \text{ et } \sqrt{17}; \sqrt{2} + \sqrt{3} \text{ et } 3; \sqrt{2} + \sqrt{3} \text{ et } 5; \sqrt{3} - \sqrt{2} \text{ et } \frac{1}{2} \sqrt{5} + \sqrt{2} \text{ et } \sqrt{11}.$$

Rédaction Soit par exemple à comparer $2\sqrt{2} + 1$ et $\frac{5}{2}$. On a :

$$(2\sqrt{2} + 1)^2 = 8 + 4\sqrt{2} + 1 = 9 + 4\sqrt{2} \text{ et } \left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}.$$

$$\text{On a : } 9 + 4\sqrt{2} \geq \frac{25}{4} \iff 36 + 16\sqrt{2} \geq 25 \iff 16\sqrt{2} \geq -11$$

Cette dernière inégalité est vraie. Par conséquent, l'inégalité $9 + 4\sqrt{2} \geq \frac{25}{4}$ est vraie donc on a

$(2\sqrt{2} + 1)^2 \geq \left(\frac{5}{2}\right)^2$. Comme $2\sqrt{2} + 1 \geq 0$ ainsi que $\frac{5}{2}$ on a $2\sqrt{2} + 1 \geq \frac{5}{2}$. (il faut comprendre que l'on utilise la croissance de la fonction carrée sur \mathbb{R}^+ dans la dernière étape.)

Exercice 5

Exprimer sans racine carrée (ou avec strictement moins) :

$$\begin{array}{ccc} \sqrt{(-5)^2} & \sqrt{(\sqrt{3}-1)^2} & \sqrt{(\sqrt{3}-2)^2} \\ \sqrt{(2-\sqrt{7})^2} & \sqrt{(3-\pi)^2} & \sqrt{(3-a)^2} \text{ selon les valeurs de } a \end{array}$$

Exercice 6

Méthode : Pour rendre rationnel un dénominateur, on utilise l'identité $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$.

$$\text{Ainsi : } \frac{1}{2+\sqrt{2}} = \frac{2-\sqrt{2}}{(2+\sqrt{2})(2-\sqrt{2})} = \frac{2-\sqrt{2}}{4-2} = \frac{2-\sqrt{2}}{2}$$

Ecrire aussi simplement que possible :

$$\begin{array}{ccc} (2\sqrt{5})^2 & (2+\sqrt{5})^2 & (3+\sqrt{7})^2 - (3-\sqrt{7})^2 \\ \left(\sqrt{2\sqrt{3}}\right)^4 & \left(\frac{5-\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)^2 & \left(\frac{5\sqrt{2}}{\sqrt{3}+1}\right)^2 \\ (\sqrt{2}+\sqrt{3})^2 + (\sqrt{2}-\sqrt{3})^2 & \frac{5+2\sqrt{6}}{\sqrt{2}+\sqrt{3}} + \frac{5-2\sqrt{6}}{\sqrt{2}-\sqrt{3}} & \end{array}$$

Exercice 7

Rendre rationnels les dénominateurs des expressions suivantes :

$$\begin{array}{ccc} \frac{2-\sqrt{3}}{2+\sqrt{2}} & \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1} & \frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{5}}{\sqrt{2}+\sqrt{3}} \\ \frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}-\sqrt{3}} & \frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}}{1-\sqrt{3}} \end{array}$$

Exercice 8

Rapports Pour tout $(a, b) \in (\mathbb{R}^+)^2$

$$\begin{array}{l} \sqrt{a} = \sqrt{b} \iff a = b \\ \sqrt{a} = b \iff a = b^2 \end{array}$$

Vérifier les égalités suivantes : (il faut utiliser les identités remarquables, elles sont rappelées à l'exercice 15).
 $\sqrt{4+2\sqrt{3}} = 1+\sqrt{3}$, $\sqrt{7-4\sqrt{3}} = 2-\sqrt{3}$, $\sqrt{3+\sqrt{5}}-\sqrt{3-\sqrt{5}} = \sqrt{2}$, $\sqrt{3-2\sqrt{2}}+\sqrt{3+2\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$.

Exercice 9

Définition du factoriel : Soit n un entier naturel

$$\begin{aligned} 0! &= 1 \\ 1! &= 1 \\ \text{si } n \geq 2, n! &= 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n \end{aligned}$$

- Simplifier $\frac{12!}{8!}$, $\frac{12!}{3!10!}$, $\frac{1}{9!} - \frac{1}{10!}$
- Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et a, b deux réels strictement positifs, simplifier

$$A_n = \frac{(n+3)!}{(n+1)!}, \quad B_n = \frac{n+2}{(n+1)!} - \frac{1}{n!}, \quad C_n = \frac{u_{n+1}}{u_n} \text{ où } u_n = \frac{a^n}{n!b^{2n}}$$

Exercice 10

Rappels : pour n et m entiers relatifs, a et b nombres complexes

$$\begin{aligned} a^n \times a^m &= a^{m+n} \\ (a^m)^n &= a^{mn} \\ \frac{a^n}{a^m} &= a^{n-m} \text{ (} a \text{ étant ici non nul)} \\ (ab)^n &= a^n b^n \\ \left(\frac{a}{b}\right)^n &= \frac{a^n}{b^n} \text{ (} b \text{ étant ici non nul)}. \end{aligned}$$

Développez, regroupez, réduisez.

$$\begin{aligned} A &= (7xy)^3, \quad B = (2a^2b^3)^5, \quad C = \left[\left(\frac{-a}{b}\right)^3\right]^2 \times [(-b)^2]^3, \quad D = xy \times \left(\frac{-2}{3}\right)x^2 \times \frac{3}{4}y^2, \\ E &= \left(\frac{2}{7}\right)a^2 \times \left(\frac{-3}{4}\right)xy^3 \times \left(\frac{-2}{5}\right)a^2x, \quad F = \left(\frac{-3}{5}\right)a^2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)b^2x \cdot (-x)^4, \quad G = 4x^3 \cdot (-3y^2) \cdot \left(\frac{-5}{6}\right)a^2x^2y^5. \end{aligned}$$

Exercice 11

Simplifier :

$$\begin{aligned} A &= \frac{4^{12}}{2^{25}}; \quad B = \frac{3}{2} \frac{2^n}{3^{n+1}}; \quad E = \frac{2}{3} \left(\frac{3}{4}\right)^2 \\ F &= (-1)^3 \left(-\frac{7}{8}\right)^3 \times \left(-\frac{2}{7}\right)^2 \times (-7) \times \left(-\frac{1}{14}\right) \\ G &= 77^{-1} \times 7^4 \times 11^2 \times (7 \times 11)^4 \times (7^2)^{-8} \times (7^{-9})^{-3} \times \frac{1}{(-11)^{-3}} \\ K &= (a^{n^2})^2; \quad L = \frac{a^{n^2}}{a^n}; \quad M = a^{3n}(a^n)^3; \quad P = (a^n)^n. \end{aligned}$$

Exercice 12

Réduire et ordonner les polynômes suivants :

$$\begin{aligned} P(x) &= 7x^3 + 8x - 3 + 4x - 2x^3 - 5x + 2 \\ Q(x) &= -\frac{3}{2}x^2 + \frac{5}{4}x - 3x^2 + \frac{x}{6} - \frac{5}{2}x^2 + 5 + 4x^2 \\ R(x) &= \frac{3}{2}x^2 + xy + y^2 - 2xy + \frac{x^2}{3} - \frac{3}{2}x^2 \\ S(a) &= 4a^2 - \frac{2}{3}a - \frac{2}{5}a^2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}a - 5a + \frac{2}{15}a^2 - \frac{3}{4} \\ T(x) &= 4x^2 - \frac{7}{2} + \frac{3}{5}x - \frac{5}{2}x^2 + \frac{4}{3}x^3 - 5 + \frac{3}{2}x^3 + 7 - 2x \end{aligned}$$

Exercice 13Former les polynômes $A + B + C$; $A - B + C$; $A + B - C$; $-A + B + C$ avec

$$A = 3x^2 - 4x + 5$$

$$B = 2x^2 + 4 - 5x$$

$$C = 3 - x + 4x^2$$

Exercice 14

Même question avec

$$A = 5a^2 - 3ab + 7b^2$$

$$B = 9b^2 - 8ab + 6a^2$$

$$C = -7b^2 - 3ab + 4a^2$$

Exercice 15

Effectuer les produits suivants, réduire et ordonner les résultats :

$$A = (4x^5 + 7 - 2x^3)(x^3 - 2x)$$

$$B = (5x^3 - 2x)(3x - 4x^2)$$

$$C = (7x^4 - 2x^3 + 4x^2)(3x^2 - 5)$$

$$D = (2x^2 - 4 + 2x)(x^2 + 5 - 2x)$$

$$E = (2x - 7x^2 + 5x^3)(3x - 5x^2 + 8)$$

$$F = \left(\frac{5}{4}x^3 - 2x + \frac{1}{2}\right) \left(\frac{7}{2}x^3 - 2x + \frac{1}{2}\right)$$

$$G = (3x^2 - 1)(x + 1)(x - 1)$$

$$H = (4x^3 - 7x + 2x^2 + 5)^2$$

Exercice 16**Rappels** : pour tout a et b nombres complexes

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$$

On a aussi $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$ (vérifier cette égalité.)On a aussi $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$ (vérifier cette égalité.)Démontrer que pour tous réels a, b, c , on a les égalités :

$$(a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab$$

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - bc - ca - ab)$$

$$= \frac{1}{2}(a + b + c)((b - c)^2 + (c - a)^2 + (a - b)^2)$$

Exercice 17

Factoriser :

$$A = x^2 - 2x + 1$$

$$B = x^2 + x + \frac{1}{4}$$

$$C = 4x^2 - 4x + 1$$

$$D = a^2 + 4a + 4$$

$$E = 4x^3 + 8x^2y + 4xy^2$$

$$F = (x + y)^3 - x^3 - y^3$$

$$G = (x - y)^3 - x^3 + y^3$$

$$H = x^3 + 27y^3$$

$$K = 8a^3 - 125$$

Exercice 18

Utiliser les identités remarquables pour développer les produits suivants :

$$A = \left(\frac{3}{2}x^3 - \frac{2}{5}y^2\right)^2$$

$$B = \left(\frac{4}{3}x^5 + \frac{2}{5}y^3\right)^2$$

$$C = \left(\frac{2}{5}x^2 - \frac{3}{4}y\right) \left(\frac{2}{5}x^2 + \frac{3}{4}y\right)$$

$$D = \left(\frac{2}{3}a^2x^3 - \frac{1}{2}b^4\right) \left(\frac{2}{3}a^2x^3 + \frac{1}{2}b^4\right)$$

$$E = (3x + 4y - 5)(3x + 4y + 5)$$

$$F = \left(\frac{2}{3}x - \frac{4}{5}y - 1\right) \left(\frac{2}{3}x + \frac{4}{5}y + 1\right)$$

$$G = (3x + 4y - 2z)^2$$

$$H = \left(\frac{5}{2}x - \frac{3}{4}y + z\right)^2$$

Exercice 19Compléter de façon à obtenir une expression de la forme $(T + U)^2$

$$A = x^2 + \dots + 16$$

$$B = x^2 - \dots + 9a^2$$

$$C = 4x^2 - 4x + \dots$$

$$D = 9x^2 + 6x + \dots$$

$$E = x^2 + \dots + y^4$$

$$F = 4a^2x^2 - \dots + 1$$

Exercice 20

Factoriser :

$$A = \frac{5}{2}x^3y^2 - 5x^2y^2 + \frac{5}{2}xy^2$$

$$B = 18abx^2 - 12abx + 2ab$$

$$C = \frac{4}{5}a^3x^2 - 5a^3y^2$$

$$D = \frac{3}{4}a^2bx^2 - \frac{25}{3}a^2by^2$$

$$E = 25a^2x^4y^2 - 4b^2y^2$$

$$F = (2x - 3)^2 - (3x - 5)^2$$

$$G = (2x + 3)^2 - 4(2x + 3)$$

$$H = (5x^2 + 3x - 2)^2 - (4x^2 - 3x - 2)^2$$

$$I = (3x - 5)^2 + (3x - 5)(2x + 3)$$

$$J = (a^2 + b^2 - 2)^2 - (2ab - 2)^2$$

$$K = a(x^2 + 1) - x(a^2 + 1)$$

$$L = ab(x^2 + y^2) + xy(a^2 + b^2)$$

$$M = (a^2 + b^2 - 10)^2 - (a^2 - b^2 - 8)^2$$

$$N = (4a^2 + b^2 - 9c^2)^2 - 16a^2b^2$$

Exercice 21

Simplifier les expressions suivantes, en admettant qu'elles sont définies :

$$A = \frac{7a^2x^5}{2b^2x^4} \quad B = \frac{-2a^3b^2x}{3a^3bx^3} \quad C = \frac{10a^2x^3y^2}{-4a^4x^3y}$$

$$D = \frac{x^2}{x^2 - x} \quad E = \frac{x^2 + x^3}{x^3 - x} \quad F = \frac{6x^2}{9ax}$$

$$G = \frac{ax + by}{a^2x^2 - b^2y^2} \quad H = \frac{x^3 - 9x}{3x^2 - 9x} \quad I = \frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 - 1}$$

Exercice 22

Réduire le plus possible.

$$A = \frac{x+1}{6} + 2\frac{2x-1}{21} - \frac{3x+1}{14} \quad B = \frac{x+2}{5} - \frac{4x+3}{15} - \frac{x+1}{3}$$

$$C = \frac{1}{a(a+1)} - \frac{3}{a(a-1)} + \frac{x^2-3}{a^2-1} \quad D = \frac{x+2}{2a+1} - \frac{4x+3}{2a-1} + \frac{x+1}{4a^2-1}$$

$$E = \frac{1}{x-1} - \frac{3}{x+1} + \frac{x^2-3}{x^2-1} \quad F = \frac{x}{x-1} - \frac{2}{x+1} - \frac{2}{x^2-1}$$

$$G = \frac{2}{x+2} - \frac{1}{x-2} + \frac{4}{x^2-4} \quad H = \frac{x-2}{x^2+2x} - \frac{1}{x+2} - \frac{1}{x}$$

$$I = \frac{x^3}{x^3-x^2} + \frac{x}{x+1} - \frac{2x}{x^2-1} \quad J = \frac{1}{x} + \frac{x-2}{x^2-4} - \frac{2}{x^2+2x}$$

Exercice 23Pour a, b réels et n un entier naturel non nul, factoriser

$$C = 16a^2 - 8a + 1; D = a^4 - 4a^2b^2 + 4b^4; F = a^2 + 2a^4 - b^2 - 2b^4; G = a^{2n} - 1; J = a^3 + 8 + (a+2)(2a-5);$$

$$K = a^2 - 4b^2; L = 4a^2 + b^2 - 4ab; M = a^{2n} - 4^n; P = (a+b)^2 - 4ab$$

Rappel : Somme des termes d'une suite géométrique : pour tout q réel (ou complexe)

$$1 + q + q^2 + \dots + q^n = \begin{cases} \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}; & \text{si } q \neq 1 \\ n + 1; & \text{si } q = 1 \end{cases}$$

Plus généralement si (u_n) est une suite géométrique de raison q , pour tout entier p et r :

$$u_p + u_{p+1} + \dots + u_r = \begin{cases} u_p \frac{1 - q^{r-p+1}}{1 - q} = 1^{er} \text{ terme} \times \frac{1 - q^{\text{nombre de termes}}}{1 - q}; & \text{si } q \neq 1 \\ u_p(r - p + 1); & \text{si } q = 1 \end{cases}$$

Exercice 24Calculer en fonction de n

$$A_n = 1 + 3 + 9 + \dots + 3^{2n}$$

$$B_n = -1 + 4 - 16 + \dots + (-1)^{n-1}4^n$$

$$C_n = 1 - a^2 + a^4 - a^6 + \dots + (-1)^n a^{2n}$$

$$D_n = u_0 + \dots + u_n \text{ où } u_n = (-5)^{3n+1}$$

Exercice 25

Calculer $A_n = 9 + 27 + \dots + 3^{n+2}$.
 Calculer de même $B_n = a^2 + a^4 + \dots + a^{2n}$ et $C_n = 3^{n+2} + 3^{n+3} + \dots + 3^{2n+4}$.

Exercice 26

Rappels : pour tout réel strictement positifs x et y , pour tout entier relatif n ,

| | | |
|---|-----------------------------|---|
| $\ln(xy) = \ln(x) + \ln(y)$ $\ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x)$ $\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln(x) - \ln(y)$ $\ln(x^n) = n\ln(x)$ $\ln(1) = 0$ $\ln(e) = 1$ | Pour tout réel a et b , | $e^{a+b} = e^a e^b$ $\frac{1}{e^a} = e^{-a}$ $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$ $e^{na} = (e^a)^n$ $e^0 = 1$ $\ln(e^a) = a$ $e^{\ln(x)} = x$ |
|---|-----------------------------|---|

Calculer les nombres suivants

- en fonction de $\ln 2$:
 $\ln 16$; $\ln 512$; $\ln 0.125$; $\frac{1}{8} \ln \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \ln \frac{1}{8}$; $\ln 72 - 2 \ln 3$
- en fonction de $\ln 2$ et $\ln 3$:
 $\ln 36$; $\ln \frac{1}{12}$; $\ln 2.25$; $\ln 21 + 2 \ln 14 - 3 \ln 0.875$
- en fonction de $\ln 2$ et $\ln 5$:
 $\ln 500$; $\ln \frac{16}{25}$; $\ln 6.25$; $\ln \frac{1}{2} + \ln \frac{2}{3} + \dots + \ln \frac{98}{99} + \ln \frac{99}{100}$

Exercice 27

Calculer $(1 + \sqrt{2})^2$ et $\frac{1}{\sqrt{2} + 1}$.

En déduire que $\frac{7}{16} \ln(3 + 2\sqrt{2}) - 4 \ln(\sqrt{2} + 1) = \frac{25}{8} \ln(\sqrt{2} - 1)$

Exercice 28

Calculer y sachant que
 $\ln y = \ln(7 + 5\sqrt{2}) + 8 \ln(\sqrt{2} + 1) + 7 \ln(\sqrt{2} - 1)$

Exercice 29

Simplifier

$$A = \ln((2 + \sqrt{3})^{20}) + \ln((2 - \sqrt{3})^{20}); B = \ln\left(\frac{\sqrt{5} + 1}{2}\right) + \ln\left(\frac{\sqrt{5} - 1}{2}\right)$$

Exercice 30

Simplifier les nombres suivants

$$e^{3 \ln 2}; \ln(\sqrt{e}); \ln(e^{\frac{1}{3}}); e^{-2 \ln 3}; \ln(e^{-\frac{1}{2}}); \ln(\sqrt[5]{e})$$

Remarque : On a, pour tout $a \geq 0$, $\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$ et, si $a > 0$, $\ln(a^{\frac{1}{n}}) = \frac{1}{n} \ln(a)$.

Exercice 31

Simplifier les expressions suivantes :

$$a = e^{\ln 3 - \ln 2} \qquad b = e^{-\ln \frac{1}{2}} \qquad c = e^{-\ln \ln 2} \qquad d = \ln\left(\frac{1}{e^{17}}\right)$$

$$f = \ln(\sqrt{e^4}) - \ln(\sqrt{e^2}) \qquad g = \ln(\sqrt{\exp(-\ln e^2)})$$

$$h = \exp\left(-\frac{1}{3} \ln(e^{-3})\right)$$

Exercice 32

Rédaction quant à la résolution d'une équation. En premier lieu, il faut toujours introduire l'inconnue et préciser dans quel ensemble appartient a priori cette inconnue ceci en écrivant "Soit $x \in \mathbb{R}$ " si par exemple l'inconnue est dans \mathbb{R} . Ensuite il faut, si nécessaire, regarder pour quelle(s) valeur(s) de cette inconnue chacun des éléments de l'équation est défini. Enfin, il faut le plus possible résoudre cette équation par une succession d'équivalence.

Exemple : Résolvons l'équation (E) $2x + 5 = 4x + 3$ dans \mathbb{R} .

Soit $x \in \mathbb{R}$, (E) $\iff 2x - 2 = 0 \iff \boxed{x = 1}$.

Autre exemple : (F) : $\frac{x-1}{x^2-5x+6} = \frac{1}{3}$.

Soit $x \in \mathbb{R}$. Le discriminant de $x^2 - 5x + 6$ vaut 1. On a donc $x^2 - 5x + 6 = 0 \iff x = 2$ ou $x = 3$. Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \{2, 3\}$. On a : (F) $\iff 3x - 3 = x^2 - 5x + 6 \iff x^2 - 8x + 9 = 0$. Le discriminant de $x^2 - 8x + 9$ vaut 28. On a donc (F) $\iff x = \boxed{\sqrt{7} + 4 \text{ ou } x = -\sqrt{7} + 4}$.

Résoudre les équations suivantes :

$$\ln(-x - 5) = \ln(x - 61) - \ln(x + 7) \quad (1)$$

$$\ln(-x - 5) = \ln\left(\frac{x - 61}{x + 7}\right) \quad (2)$$

Exercice 33

Résoudre les inéquations suivantes (efforcez-vous de faire la rédaction complète et correcte comme montré ci-avant.) :

$$e^{3x-5} \geq 12 \quad (1) \qquad 1 \leq e^{-x^2+x} \quad (3)$$

$$e^{1+\ln x} \geq 2 \quad (2) \qquad e^{-6x} \leq \sqrt{e} \quad (4)$$

Exercice 34

Résoudre les équations suivantes :

$$(1) 3x = 4 \quad (2) \frac{4}{x-3} = 2 \quad (3) \frac{2x+3}{x-5} = \frac{4}{3} \quad (4) \frac{3}{x-\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{3-x}}$$

Exercice 35

Résoudre les équations suivantes :

$$(1) 5(2x - 3) - 4(5x - 7) = 19 - 2(x + 11); \quad (2) 4(x + 3) - 7x + 17 = 8(5x - 3) + 166;$$

$$(3) 17 - 14(x + 1) = 13 - 4(x + 1) - 5(x - 3) \quad (4) 17x + 15(x - 1) = -1 - 14(3x + 1)$$

Exercice 36

Résoudre les équations suivantes :

$$(1) (x - 1)(x - 2)(x - 3) = 0 \quad (2) x(5x + 1)(4x - 3)(3x - 4) = 0$$

$$(3) x(x + 1) = x + 1 \quad (4) (x + 5)(4x - 1) + x^2 - 25 = 0$$

$$(5) 4x^2 - 49 = 0 \quad (6) (x + 7)^2 - 81(x - 5)^2 = 0$$

$$(7) 3x^3 - 12x = 0 \quad (8) (3x + 1)(x - 3)^2 = (3x + 1)(2x - 5)^2$$

Exercice 37

Résoudre les équations suivantes

$$a) 8x^2 - 6x + 1 = 0 \quad b) x^2 - 10x + 16 = 0 \quad c) x^2 - (\sqrt{2} + \sqrt{8})x + 4 = 0$$

$$d) x^2 - (a + 2)x + 2a = 0 \quad e) x^2 + (1 + \pi)x + \pi = 0 \quad f) -x^2 + 8x + 6 = 0$$

$$g) 8x^2 + 6x + 1 = 0 \quad h) -x^2 + 6x = 0 \quad i) 3x^2 = 8$$

$$j) 169x^2 + 13x - 1 = 0 \quad k) x^2 + 4ax + 3a^2 = 0 \quad l) -12x^2 + 125 = 0$$

$$m) -6x^2 + 7x - 1 = 0$$

Exercice 38

Résoudre avec une rédaction correcte les équations suivantes : (il faut mettre sous le même dénominateur).

$$\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2} = \frac{7}{12} \quad , \quad \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} = \frac{1}{24}$$

$$(3x - 1)(2x + 1) = 9x^2 - 1 \quad , \quad \frac{x^2-x-1}{x+2} = 2x + 3$$

Exercice 39

Un exemple : Résolvons $\sqrt{x^2 - 5} = 2x + 4$. (E)

Soit $x \in \mathbb{R}$. On a $x^2 - 5 \geq 0 \iff x \in]-\infty, -\sqrt{5}] \cup [\sqrt{5}, +\infty[$ et $2x + 4 \geq 0 \iff x \geq -2$. De plus, $-\sqrt{5} \leq -2$ car $5 \geq 4$. Soit donc $x \in [\sqrt{5}, +\infty[$. On a (E) $\iff x^2 - 5 = 4x^2 + 16x + 16 \iff 3x^2 + 16x + 21 = 0 \iff x = -3$ ou $x = -\frac{7}{3}$. Les deux valeurs obtenues sont inférieures à $\sqrt{5}$ donc à exclure. Ainsi (E) n'a pas de solution.

Résoudre rigoureusement les équations suivantes :

$$\sqrt{x^2 - 3} = 5x - 9 \quad (1) \quad \sqrt{x + 4} + \sqrt{x + 2} = 1 \quad (2) \quad \sqrt{x + 4} - \sqrt{x + 2} = 1 \quad (3)$$

Exercice 40

Rappel : signe d'un trinôme du second degré

Pour tout $a \in \mathbb{R}^*$ pour tout $(b, c) \in \mathbb{R}^2$,
 si l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ a deux solutions réelles x_1 et x_2 ,
 $ax^2 + bx + c$ est du signe de $-a$ entre x_1 et x_2 et du signe de a sinon.
 Si cette équation n'a pas de solution réelle ou n'a qu'une seule solution, $ax^2 + bx + c$ est
 du signe de a sur \mathbb{R} .

Remarque : Une expression du type $\frac{ax+b}{cx+d}$ a le même signe que l'expression $(ax+b)(cx+d)$ et on utilise le résultat encadré ci-dessus.

Résoudre sans tableau de signes ni le moindre calcul les inéquations suivantes :

$$(3x - 1)(x - 5) < 0 \quad (5 - 2x)(3 + x) > 0 \quad \frac{2x+1}{x-5} \leq 0$$

Exercice 41

Méthode : Lorsqu'il y a plusieurs fractions rationnelles dans une inéquation, il faut mettre sous le même dénominateur

Exemple : Résolvons : $\frac{1}{x+4} + \frac{x}{x+2} \geq 1$ (E).

Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \{-4, -2\}$. On a (E) $\iff \frac{1}{x+4} + \frac{x}{x+2} - 1 \geq 0 \iff \frac{-x-6}{(x+2)(x+4)} \geq 0$ A partir de là, on peut éventuellement établir un tableau de signe avec deux lignes seulement, (et non trois!) une pour le signe de $-x - 6$, une pour $(x + 2)(x + 4)$. On obtient ensuite, (E) $\iff x \in] - \infty, -6] \cup] - 4, -2[$.

Résoudre les inéquations et systèmes d'inéquations suivants :

$$x^2 + 1 > 2x - 3 \quad 2x - 1 \leq x^2 + 4 \quad \frac{1}{x-1} < \frac{3}{x-2} \quad \frac{4}{x} + \frac{1}{x-2} \geq 1$$

$$(x^2 - 5x + 4)(x^2 - 4x + 3) > 0 \quad (x^2 - 5x + 4)(x^2 - 9x + 14) \leq 0 \quad 5 \leq x^2 - 14x + 50 \leq 26 \quad 0 \leq \frac{(x-3)^2}{(x+1)^2} < 1$$

Exercice 42

Résoudre les inéquations suivantes :

$$2x - \sqrt{x} - 1 < 0 \quad x + 1 < \sqrt{x + 4} \quad x - 3 \geq \sqrt{x^2 - 2x}$$

Exercice 43

Résoudre l'équation $x^4 - 4x^2 - 5 = 0$.

Exercice 44

Résoudre successivement les équations suivantes :

$$(\ln x)^2 - \ln x - 42 = 0 \quad (\ln x)^2 - \frac{42}{(\ln x)^2} = 1$$

Exercice 45

Rappel : valeur absolue.

Pour tout réel **positif** r et pour tout réel a , x et y , on a

$$|x| = x \text{ si } x \geq 0 \text{ et } |x| = -x \text{ si } x \leq 0.$$

$$\sqrt{x^2} = |x|.$$

$$|x| \leq r \iff -r \leq x \leq r$$

$$|x| \geq r \iff x \leq -r \text{ ou } x \geq r$$

$$|x - a| \leq r \iff a - r \leq x \leq a + r$$

$$|x - a| \geq r \iff x \leq a - r \text{ ou } x \geq a + r$$

$$|x| = |y| \iff x^2 = y^2$$

$$|x| \leq |y| \iff x^2 \leq y^2.$$

Exercice 46

Résoudre les inéquations suivantes :

$$(1) |x - 3| \leq 4 \quad (2) |2x + 1| \geq 5 \quad (3) |x + 2| > -5 \quad (4) |x - 1| \leq |2x + 3| \quad (5)$$

$$|-2x + 3| \leq 7$$

Exercice 47

Simplifier, pour x non nul, l'expression $f(x) = xe^{\frac{1}{2}|\ln(x^2)|}$.

Rappels : pour tout u et v nombres réels

$$\begin{aligned}
\cos(u) = \cos(v) &\iff u = v + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \text{ ou } u = -v + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}. \\
\sin(u) = \sin(v) &\iff u = v + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \text{ ou } u = \pi - v + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}. \\
\cos(u + 2\pi) = \cos(u) \quad \sin(u + 2\pi) = \sin(u) \quad \cos(-u) = \cos(u) \quad \sin(-u) = -\sin(u) \\
\sin(\pi - u) = \sin(u) \quad \sin(u + \pi) = -\sin(u) \quad \cos(u + \pi) = \cos(\pi - u) = -\cos(u) \\
\sin(u + \frac{\pi}{2}) = \sin(\frac{\pi}{2} - u) = \cos(u) \quad \cos(u + \frac{\pi}{2}) = -\sin(u) \quad \cos(\frac{\pi}{2} - u) = \sin(u)
\end{aligned}$$

Exercice 48

Résoudre les équations suivantes :

$$\sin x = \sin(\pi - 3x) \quad (1) \quad \sin(2x - \frac{\pi}{3}) = \sin(3x + \frac{\pi}{2}) \quad (2) \quad \cos 2x + \cos \frac{x}{2} = 0 \quad (3) \quad \cos(\frac{7\pi}{5} - x) = \cos(\frac{2\pi}{5} + 3x) \quad (4)$$

$$\cos x = \sin \frac{7x}{5} \quad (5) \quad \cos 4x = \sin 7x \quad (6) \quad \sin(\frac{5\pi}{2} - x) + \cos 2x = 0 \quad (7) \quad \sin 2x + \cos 3x = 0 \quad (8)$$

Exercice 49

Résoudre les systèmes suivants :

$$(S_1) \begin{cases} \sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \pi \leq x \leq 2\pi \end{cases} \quad (S_2) \begin{cases} \cos x = -\frac{1}{2} \\ 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$$

Exercice 50

Rappels : formules de trigonométrie.

$$\begin{aligned}
&\cos^2(a) + \sin^2(a) = 1 \\
&\cos(a+b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b) \\
&\cos(a-b) = \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b) \\
&\sin(a+b) = \sin(a)\cos(b) + \sin(b)\cos(a) \\
&\sin(a-b) = \sin(a)\cos(b) - \sin(b)\cos(a) \\
&\sin(2a) = 2\sin(a)\cos(a) \\
&\cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a) = 2\cos^2(a) - 1 = 1 - 2\sin^2(a)
\end{aligned}$$

En remarquant que $\frac{5\pi}{12} = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4}$, calculer $\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right)$, $\sin\left(\frac{5\pi}{12}\right)$.

Exercice 51

Simplifier $\frac{\sin(2a)}{\sin(a)} - \frac{\cos(2a)}{\cos(a)}$.

Exercice 52

Calculer $\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ en fonction de $\sin(x)$ et de $\cos(x)$;

En déduire la résolution des équations $\sin(x) + \cos(x) = 1$ puis $\sin(x) + \cos(x) = \sqrt{2}$.

$$\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}(\cos(x) + \sin(x))$$

$$\sin(x) + \cos(x) = 1 \iff \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \iff x \in \{2k\pi; k \in \mathbb{Z}\} \cup \left\{\frac{\pi}{2} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\right\}$$

$$\sin(x) + \cos(x) = \sqrt{2} \iff \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 1 \iff x \in \left\{\frac{\pi}{4} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\right\}$$

Exercice 53

Donner la forme algébrique des nombres complexes suivants :

$$\begin{aligned}
a &= (3 + 4i)(4 - 3i) & b &= (3 - i)^2 & c &= (2 + i\sqrt{3})(2 - i\sqrt{3}) \\
d &= \frac{2}{1 + i} & e &= \frac{1}{3 - i\sqrt{2}} & f &= \frac{1}{i\sqrt{2} - 1} \\
g &= \frac{2 - 5i}{3 + 2i} & h &= \frac{6 + 3i}{1 - 2i} & k &= \frac{3i}{3 + 4i} \\
l &= \frac{2}{1 - 2i} + \frac{3}{2 + i} & m &= 2i - \frac{3}{i - 3}
\end{aligned}$$

Exercice 54

Résoudre dans \mathbb{C} les équations suivantes d'inconnue z et donner les solutions sous forme algébrique :

$$(1) \quad iz = 3 + i \quad (2) \quad (2 - i)z - 2i = iz + 2 - 3i$$

$$(3) \quad (2iz + i)(4z - 8 - 4i) = 0 \quad (4) \quad \frac{z-2i}{z+2} = 4i$$

$$(5) \quad 4\bar{z} + 2i - 4 = 0 \quad (6) \quad ((iz - 2 + i)(2i\bar{z} + i - 2) = 0$$

$$(7) \quad 2z + i\bar{z} = 4 \quad (8) \quad 2iz - \bar{z} = 4i$$

Exercice 55

Mettre sous forme algébrique, placer sur le cercle trigonométrique et, si ce n'est pas déjà le cas, écrire sous forme trigonométrique $e^{i\alpha}$ les nombres suivants :

$$a = e^{0i\pi} \quad b = e^{\frac{2i\pi}{3}} \quad c = e^{2i\pi} \quad d = e^{i\pi} \quad f = e^{-2i\pi} \quad g = -e^{i\frac{\pi}{2}}$$

$$h = e^{-i\frac{\pi}{2}} \quad j = -e^{i\frac{\pi}{3}} \quad k = ie^{i\frac{\pi}{4}} \quad \ell = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2} \quad m = -\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}$$

Exercice 56

Rédaction pour les limites :

Bien distinguer les types de justifications pour les limites à savoir :

— par opérations algébriques (somme, quotient, produit), par exemple : $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x + x + 5 = +\infty$

— par comparaison, par exemple pour déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{2 + \cos(x)}e^x$, on peut procéder ainsi : pour tout $x \geq 0$, $\sqrt{2 + \cos(x)} \geq 1$ donc $\sqrt{2 + \cos(x)}e^x \geq e^x$. $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ donc, par comparaison, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{2 + \cos(x)}e^x = +\infty$.

— par encadrement, par exemple $-\frac{1}{x} \leq \frac{\sin(x^2)}{x} \leq \frac{1}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$ donc par encadrement $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin(x^2)}{x} = 0$

— par composition (ce qui revient à effectuer un changement de variable), par exemple, pour déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x^3}$ on peut rédiger ainsi : On pose $u(x) = x^3$, on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-u} = 0$, donc par composition, $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x^3} = 0$.

— par croissance comparées, par exemple $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = 0$

Rappels : limites par croissances comparées : pour tout $a \in \mathbb{R}^+$, pour tout $p \in \mathbb{N}$, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

| | | | |
|---|---|---|--|
| $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{ax}}{x^n} = +\infty$ | $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^p(x)}{x^n} = 0$ | $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^{ax} = 0$ | $\lim_{x \rightarrow 0} x^n \ln^p x = 0$. |
|---|---|---|--|

Déterminer la limite en $+\infty$ des fonctions suivantes en calquant la rédaction comme expliquée ci-dessus.

$$a : x \mapsto e^{-\sqrt{x}} \quad b : x \mapsto \frac{x+7}{4x+3} \quad c : x \mapsto \frac{x^2+5}{x^3-1} \quad d : x \mapsto \frac{\sin x}{x}$$

$$e : x \mapsto \cos(x^2)e^{-x} \quad f : x \mapsto \frac{\ln(\ln(x))}{\ln x} \quad g : x \mapsto (2 + \sin x)x$$

Exercice 57

Déterminer les limites en $+\infty$ des fonctions suivantes :

$$g_1(x) = \frac{x+3}{2-x} \quad g_2(x) = \frac{2x-1}{x^2-x+1} \quad g_3(x) = \frac{x^2-3x+1}{-x^2+x-1}$$

$$g_4(x) = \frac{x+\ln(x)}{2x-\ln(x)} \quad g_5(x) = \frac{2e^x-x}{e^x+1}$$

Exercice 58

Déterminer les limites en $+\infty$ des fonctions suivantes :

$$f_1(x) = \frac{x^2 + x^3 + 3 \ln x + e^{-x}}{x^4 + \cos(x) - 1} \quad f_2(x) = \frac{50x + x \ln x}{x \ln x + 3}$$

$$f_3(x) = \frac{e^{-x} + \sqrt{x} + e^x + \cos x}{x^{20} + 2x^{2016}} \quad f_4(x) = \frac{\ln(1+x)}{\ln x}$$

$$f_5(x) = \frac{e^x - 1}{x^6 + 2e^x + e^{\frac{x}{2}}} \quad f_6(x) = e^{-3\sqrt{x} + x - \ln(x^2+1) + \cos x}$$

$$f_7(x) = \sqrt{x}(\sqrt{x+1} - \sqrt{x}) \quad f_8(x) = \ln(e^{2x} + 1) - 2x$$

Exercice 59

Calculer les dérivées suivantes en précisant l'ensemble de dérivabilité.

$$f : x \mapsto \frac{1}{x} ; \quad f : x \mapsto \frac{1}{x^2} ; \quad f : x \mapsto \frac{1}{x^3} ; \quad f : x \mapsto \frac{1}{x^4}$$

$$f : x \mapsto \frac{1}{1-x} ; \quad f : x \mapsto \frac{1}{(1-x)^2} ; \quad f : x \mapsto \frac{1}{(1-x)^3} ; \quad f : x \mapsto \frac{1}{(1-x)^4}$$

$$f : x \mapsto \frac{1}{2x+1} ; \quad f : x \mapsto \frac{1}{(2x+1)^2} ; \quad f : x \mapsto \frac{1}{(2x+1)^3} ; \quad f : x \mapsto \frac{1}{(2x+1)^4}$$

Exercice 60

Justifier la dérivabilité et calculer la dérivée des les fonctions suivantes; mettre le résultat sous une forme propice à une éventuelle étude de signe

$$f_1 : x \mapsto (x-1)^3;$$

$$f_2 : x \mapsto (x^2-1)^3;$$

$$f_3 : x \mapsto 3x^2 - 6x + 1;$$

$$f_4 : x \mapsto (x-1)(x-2);$$

$$f_5 : x \mapsto \frac{x+1}{x+3};$$

$$f_6 : x \mapsto \frac{3-x}{2+x};$$

$$f_7 : x \mapsto \frac{3x+1}{1-x};$$

$$f_8 : x \mapsto 3x^2 - \frac{1}{x};$$

$$f_9 : x \mapsto (x-2)(3+x)(x-4);$$

$$g_1 : x \mapsto \frac{3x^2-2x+1}{-x+2};$$

$$g_2 : x \mapsto \frac{3x^2-2x+3}{x^2-x+2};$$

$$g_3 : x \mapsto \sqrt{2x-3};$$

$$g_4 : x \mapsto \sqrt{x^2-2x+5};$$

$$g_5 : x \mapsto \sqrt{x^2+1};$$

$$g_6 : x \mapsto \frac{1}{-x+2};$$

$$g_7 : x \mapsto \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right);$$

$$g_8 : x \mapsto \sin\left(\frac{\pi}{6} - 2x\right);$$

$$g_9 : x \mapsto \sin(2x) \cos(x);$$

$$h_1 : x \mapsto 6 \cos^2 x - 6 \cos(x) - 9;$$

$$h_2 : x \mapsto \frac{\cos(x)}{1 + \cos^2 x};$$

$$h_3 : x \mapsto 2 \sin(x) \cos(x) + \cos(x) + \sin(x)$$

$$h_4 : x \mapsto \frac{\sin(x) - x \cos(x)}{x \sin(x) + \cos(x)};$$

$$h_5 : x \mapsto \ln(5x-1);$$

$$h_6 : x \mapsto \ln(x^2+1)$$

$$h_7 : x \mapsto \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right);$$

$$h_8 : x \mapsto \ln(\ln(x));$$

$$h_9 : x \mapsto \ln|7-2x|$$

$$u_1 : x \mapsto x \ln(x) - x;$$

$$u_2 : x \mapsto e^{3x};$$

$$u_3 : x \mapsto e^{x^2-x+1}$$

$$u_4 : x \mapsto e^{\sin(x)};$$

$$u_5 : x \mapsto \frac{e^x-1}{e^x+1};$$

$$u_6 : x \mapsto e^{x \ln(x)}$$

$$u_7 : x \mapsto x e^{\frac{1}{x}};$$

$$u_8 : x \mapsto \ln(e^{2x} - e^x + 1);$$

$$u_9 : x \mapsto \frac{x}{1+e^{-x}}$$

$$v_1 : x \mapsto \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x+1}};$$

$$v_2 : x \mapsto \frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}};$$

$$v_3 : x \mapsto \sqrt{\frac{1+\sin(x)}{1-\sin(x)}};$$

$$v_4 : x \mapsto \frac{\sin(2x)}{\cos(2x)}$$

Exercice 61

Déterminer l'ensemble des primitives de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur \mathbb{R}^{-*} .

Exercice 62

Déterminer les primitives des fonctions suivantes sur un ensemble convenable à déterminer.

$$f : x \mapsto x^{16} - 35x^{13} + 14x^{11} - 3x^8 + 20x^4 + 56x^3 + 51x^2 + 18x + 1;$$

$$f_1 : x \mapsto \frac{1}{x};$$

$$f_2 : x \mapsto \frac{1}{x^2};$$

$$f_3 : x \mapsto \frac{1}{x^3};$$

$$f_4 : x \mapsto \frac{1}{x^4};$$

$$g_1 : x \mapsto \frac{1}{1-x};$$

$$g_2 : x \mapsto \frac{1}{(1-x)^2};$$

$$g_3 : x \mapsto \frac{1}{(1-x)^3};$$

$$g_4 : x \mapsto \frac{1}{(1-x)^4};$$

$$h_1 : x \mapsto \frac{1}{2x+1};$$

$$h_2 : x \mapsto \frac{1}{(2x+1)^2};$$

$$h_3 : x \mapsto \frac{1}{(2x+1)^3};$$

$$h_4 : x \mapsto \frac{1}{(2x+1)^4};$$

Exercice 63

Déterminer une primitive des fonctions suivantes.

| | | |
|---|--|--|
| a) $x \mapsto 4x^2 - 5x + \frac{1}{x^2}$; | b) $x \mapsto x(2x^2 + 1)^4$; | c) $x \mapsto (x - 1)^3$ |
| d) $x \mapsto (x^2 - 1)^3$; | e) $x \mapsto \frac{1}{x^2} - \frac{1}{\sqrt{x}}$; | f) $x \mapsto \sqrt{x} + 1$; |
| g) $x \mapsto \sin 2x$ | h) $x \mapsto \cos 3x$; | i) $x \mapsto 1 - \frac{1}{\cos^2 x}$; |
| j) $x \mapsto \frac{x + 1}{(x^2 + 2x)}$; | k) $x \mapsto 2x(x^2 - 1)^5$ | l) $x \mapsto \frac{x}{(x^2 + 2)^2}$; |
| m) $x \mapsto \frac{1}{x - 3}$; | n) $x \mapsto \frac{2x + 1}{(x^2 + x + 3)^2}$; | o) $x \mapsto \frac{x^2}{x^3 - 1}$ |
| p) $x \mapsto e^{2x}$; | q) $x \mapsto \frac{e^x}{5e^x + 1}$; | r) $x \mapsto e^{2x} \sqrt[3]{1 + e^{2x}}$; |
| s) $x \mapsto \tan x$ | t) $x e^{x^2}$; | u) $x \mapsto \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}$; |
| v) $x \mapsto \frac{5}{\sqrt[3]{x}}$; | w) $x \mapsto \frac{1}{x^2 \sqrt{x}}$ | x) $-\sqrt{e^x}$; |
| y) $x \mapsto \frac{e^x}{1 + e^x}$; | z) $x \mapsto \sin x e^{\cos x}$ | α) $x \mapsto \frac{\sqrt[3]{x}}{x^2}$ |
| β) $\frac{e^x}{(1 + 2e^x)^{\frac{3}{2}}}$; | γ) $x \mapsto \frac{\cos x - \sin x}{\cos x + \sin x}$. | |

Exercice 64

Calculer les intégrales suivantes :

$$I1 = \int_{10}^{20} \frac{dv}{v}; I2 = \int_0^1 e^{-2t} dt; I3 = \int_{10^{-5}}^{10^{-2}} \frac{dp}{2p}; I4 = \int_{275}^{315} \frac{2dT}{T}; I5 = \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} \cos(\omega t + \varphi) dt.$$

Exercice 65 (complément.)

Soient u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle I et dont les dérivées u' et v' sont continues sur I . La fonction uv est une primitive de la fonction $u'v + uv'$. Toutes les fonctions mises en jeu sont continues donc leurs intégrales existent. Pour tout couple (a, b) d'éléments de I , on a :

$$\int_a^b (u'(x)v(x) + u(x)v'(x)) dx = [u(x)v(x)]_a^b.$$

Par linéarité de l'intégrale on peut réécrire cela sous la forme :

$$\int_a^b u'(x)v(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x) dx.$$

Cette formule s'appelle la *formule d'intégration par parties* et permet de calculer des intégrales lorsque l'on n'a pas accès à la primitive directement. Par exemple pour calculer $\int_1^3 x e^x dx$, on pose $u(x) = x$; $v'(x) = e^x$; Donc $u'(x) = 1$; $v(x) = e^x$. En appliquant la formule d'intégration par parties, on obtient :

$$\int_1^3 x e^x dx = [x e^x]_1^3 - \int_1^3 1 e^x dx = 3e^3 - 1e^1 - [e^x]_1^3 = 2e^3.$$

Calculer de même :

$$\int_1^3 x \cos x dx \quad \int_0^1 x \sin x dx \quad \int_1^3 x \ln x dx$$

En utilisant deux intégrations par parties successives :

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-2x} \cos x dx$$

CORRIGÉ

Exercice 1 $\frac{19}{15}$ **Exercice 2**

$$A = a + c, \quad B = \frac{29}{12}, \quad C = \frac{7}{5}, \quad D = \frac{2}{81}, \quad E = \frac{201}{128}.$$

Exercice 3

$$A = -\frac{17}{2}, \quad B = a, \quad C = \frac{1}{a^2}, \quad D = \frac{a(a+b)}{b^2}, \quad E = \frac{a+b}{a}, \quad F = \frac{1}{a(a+b)}, \quad G = \frac{ab}{a+b}$$

Exercice 4

$$3\sqrt{2} > 17, \quad \sqrt{2} + \sqrt{3} > 3, \quad \sqrt{2} + \sqrt{3} < 5, \quad \sqrt{3} - \sqrt{2} < \frac{1}{2}, \quad \sqrt{5} + \sqrt{2} > \sqrt{11}.$$

Exercice 5

$$\sqrt{(-5)^2} = 5, \quad \sqrt{(\sqrt{3}-1)^2} = \sqrt{3}-1, \quad \sqrt{(\sqrt{3}-2)^2} = 2-\sqrt{3}, \quad \sqrt{(2-\sqrt{7})^2} = \sqrt{7}-2, \quad \sqrt{(3-\pi)^2} = \pi-3, \quad \sqrt{(3-a)^2} = \begin{cases} a-3 & \text{si } a \geq 3 \\ 3-a & \text{sinon} \end{cases}$$

Exercice 6

| | | |
|----|-----------------------------|-----------|
| 20 | 9 + 4√5 | 12√7 |
| 12 | $\frac{27 - 10\sqrt{2}}{3}$ | 50 - 25√3 |
| 10 | 2√2 | |

Exercice 7

$$\frac{4 - 2\sqrt{2} - 2\sqrt{3} + \sqrt{6}}{2}, \quad 3 - 2\sqrt{2}, \quad 1 + \sqrt{15} - \sqrt{10}, \quad \sqrt{15} + \sqrt{10} - \sqrt{6} - 2, \quad -\sqrt{2} - \sqrt{3}, \quad -\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2} + \sqrt{3} + 3}{2}$$

Exercice 8

On observe que les expressions de part et d'autre du signe égal sont de même signe puis on élève au carré. (Par exemple, on vérifie que $7 - 4\sqrt{3}$ est positif car $49 \geq 48$.)

Exercice 9

$$- \frac{12!}{8!} = 12 \times 11 \times 10 \times 9 \quad \frac{12!}{3!10!} = \frac{12 \times 11}{6} = 22, \quad \frac{1}{9!} - \frac{1}{10!} = \frac{9}{10!} = \frac{1}{10 \times 8!} = \frac{1}{403200}.$$

$$- A_n = (n+3)(n+2), \quad B_n = \frac{1}{(n+1)!}, \quad C_n = \frac{a}{(n+1)b^2}.$$

Exercice 10

$$A = 343x^3y^3, \quad B = 32a^{10}b^{15}, \quad C = a^6, \quad D = -\frac{1}{2}x^3y^3, \quad E = \frac{3}{35}a^4x^2y^3, \quad F = -\frac{2}{5}a^2b^2x^5, \quad G = 10a^2x^5y^7.$$

Exercice 11

$$A = \frac{1}{2}; \quad B = \frac{2^{n-1}}{3^n}; \quad E = \frac{3}{8}; \quad F = \frac{7}{28}; \quad G = -7^{18}11^8, \quad K = a^{2n^2}, \quad L = a^{n(n-1)}, \quad M = a^{6n}, \quad P = a^{n^2}.$$

Exercice 12

$$P(x) = 5x^3 + 7x - 1$$

$$Q(x) = -3x^2 + \frac{17}{12}x + 5$$

$$R(x) = \frac{x^2}{3} - xy + y^2$$

$$S(a) = \frac{56}{15}a^2 - \frac{16}{3}a - \frac{1}{4}$$

$$T(x) = \frac{17}{6}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - \frac{7}{5}x - \frac{3}{2}$$

Exercice 13

$$A + B + C = 9x^2 - 10x + 12$$

$$A - B + C = 5x^2 + 4$$

$$A + B - C = x^2 - 8x + 6$$

$$-A + B + C = 3x^2 - 2x + 2$$

Exercice 14

$$A + B + C = 15a^2 - 14ab + 9b^2$$

$$A - B + C = 3a^2 + 2ab - 9b^2$$

$$A + B - C = 7a^2 - 8ab + 23b^2$$

$$-A + B + C = 5a^2 - 8ab - 5b^2$$

Exercice 15

$$A = 4x^8 - 10x^6 + 4x^4 + 7x^3 - 14x$$

$$B = -20x^5 + 15x^4 + 8x^3 - 6x^2$$

$$C = 21x^6 - 6x^5 - 23x^4 + 10x^3 - 20x^2$$

$$D = 2x^4 - 2x^3 + 2x^2 + 18x - 20$$

$$E = -25x^5 + 50x^4 + 9x^3 - 50x^2 + 16x$$

$$F = \frac{35}{8}x^6 - \frac{19}{2}x^4 + \frac{19}{8}x^3 + 4x^2 - 2x + \frac{1}{4}$$

$$G = 3x^4 - 4x^2 + 1$$

$$H = 16x^6 + 16x^5 - 52x^4 + 12x^3 + 69x^2 - 70x + 25$$

Exercice 16

Méthode : développer les expressions de gauche et vérifier ainsi que l'on trouve celles de droite.

Exercice 17

$$A = (x - 1)^2$$

$$B = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2$$

$$C = (2x - 1)^2$$

$$D = (a + 2)^2$$

$$E = 4x(x + y)^2$$

$$F = 3xy(x + y)$$

$$G = 3xy(-x + y)$$

$$H = (x + 3y)(x^2 - 3xy + 9y^2)$$

$$K = (2a - 5)(4a^2 + 10a + 25)$$

Exercice 18

$$A = \frac{9}{4}x^6 - \frac{6}{5}x^3y^2 + \frac{4}{25}y^4$$

$$B = \frac{16}{9}x^{10} + \frac{16}{15}x^5y^3 + \frac{4}{25}y^6$$

$$C = \frac{4}{25}x^4 - \frac{9}{16}y^2$$

$$D = \frac{4}{9}a^4x^6 - \frac{1}{4}b^8$$

$$E = 9x^2 + 24xy + 16y^2 - 25$$

$$F = \frac{4}{9}x^2 - \frac{16}{25}y^2 - \frac{8}{5}y - 1$$

$$G = 9x^2 + 24xy - 12xz + 16y^2 - 16yz + 4z^2 \quad H = \frac{25}{4}x^2 - \frac{15}{4}xy + 5xz + \frac{9}{16}y^2 - \frac{3}{2}yz + z^2$$

Exercice 19

$$A = x^2 + 8x + 16 = (x + 4)^2$$

$$B = x^2 - 6ax + 9a^2 = (x - 3a)^2$$

$$C = 4x^2 - 4x + 1 = (2x - 1)^2$$

$$D = 9x^2 + 6x + 1 = (3x + 1)^2$$

$$E = x^2 + 2xy^2 + y^4 = (x + y^2)^2$$

$$F = 4a^2x^2 - 4ax + 1 = (2ax - 1)^2$$

Exercice 20

$$A = \frac{5}{2}xy^2(x - 1)^2$$

$$B = 2ab(3x - 1)^2$$

$$C = \frac{1}{5}a^3(2x - 5y)(2x + 5y)$$

$$D = \frac{1}{12}a^2b(3x - 10y)(3x + 10y)$$

$$E = y^2(5ax^2 - 2b)(5ax^2 + 2b)$$

$$F = -(5x - 8)(x - 2)$$

$$G = (2x + 3)(2x - 1)$$

$$H = x(3x + 2)(x + 6)(3x - 2)$$

$$I = (5x - 2)(3x - 5)$$

$$J = (a + b + 2)(a + b - 2)(a - b)2$$

$$K = (ax - 1)(-a + x)$$

$$L = (ax + by)(ay + bx)$$

$$M = 4(b - 1)(b + 1)(a - 3)(a + 3)$$

$$N = (2a + b - 3c)(2a + b + 3c)(2a - b + 3c)(2a - b - 3c)$$

Exercice 21

$$A = \frac{7a^2x}{2b^2} \quad B = -\frac{2b}{3x^2} \quad C = -\frac{5y}{2a^2}$$

$$D = \frac{x}{x-1} \quad E = \frac{x^2+x}{x^2-1} \quad F = \frac{2x}{3a}$$

$$G = \frac{1}{ax-by} \quad H = \frac{1}{3}(x+3) \quad I = \frac{x+1}{x-1}$$

Exercice 22

$$A = \frac{x}{7} \quad B = \frac{-6x-2}{15} \quad C = \frac{2}{a}; \quad D = \frac{1}{2a+1}; \quad E = \frac{x-1}{x+1}; \quad F = \frac{x}{x+1}; \quad G = \frac{1}{x+2}; \quad H = \frac{-x-4}{x^2+2x};$$

$$I = \frac{2x}{x+1}; \quad J = \frac{2}{x+2}$$

Exercice 23

$$C = (4a-1)^2; \quad D = (a^2-2b^2)^2;$$

$$F = (a^2-b^2) + 2(a^4-b^4) = (a^2-b^2) + 2(a^2-b^2)(a^2+b^2) = (a^2-b^2)(1+2a^2+2b^2);$$

$$G = (a^n)^2 - 1^2 = (a^n-1)(a^n+1);$$

$$J = (a+2)(a^2-2a+4) + (a+2)(2a-5) = (a+2)(a-1)(a+1);$$

$$K = (a-2b)(a+2b);$$

$$L = (2a-b)^2;$$

$$M = (a^n-2^n)(a^n+2^n);$$

$$P = (a-b)^2$$

Exercice 24

$$A_n = \frac{3^{2n+1}-1}{2}; \quad B_n = \frac{-1+(-4)^{n+1}}{5}; \quad C_n = \frac{1-(-a^2)^{n+1}}{1+a^2}; \quad D_n = (-5) \times \frac{1-(-5^3)^{n+1}}{1+5^3}$$

Exercice 25

$$A_n = 9 \times \frac{3^{n+1}-1}{8}; \quad B_n = a^2 \times \frac{1-a^{2n}}{1-a^2}; \quad C_n = 3^{n+2} \times \frac{3^{n+3}-1}{2}$$

Exercice 26

$$\ln 16 = 4 \ln 2; \quad \ln 512 = 9 \ln 2; \quad \ln 0.125 = -3 \ln 2; \quad \frac{1}{8} \ln \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \ln \frac{1}{8} = \frac{1}{2} \ln 2; \quad \ln 72 - 2 \ln 3 = 3 \ln 2$$

$$\ln 36 = 2 \ln 2 + 2 \ln 3; \quad \ln \frac{1}{12} = -2 \ln 2 - \ln 3; \quad \ln 2.25 = 2 \ln 3 - 2 \ln 2; \quad \ln 21 + 2 \ln 14 - 3 \ln 0.875 = 11 \ln 2 + \ln 3$$

$$\ln 500 = 2 \ln 2 + 3 \ln 5; \quad \ln \frac{16}{25} = 4 \ln 2 - 2 \ln 5; \quad \ln 6.25 = 2 \ln 5 - 2 \ln 2; \quad \ln \frac{1}{2} + \ln \frac{2}{3} + \dots + \ln \frac{99}{100} = -2 \ln 2 - 2 \ln 5$$

Exercice 27

$$(1+\sqrt{2})^2 = 3+2\sqrt{2}; \quad \frac{1}{\sqrt{2}+1} = \sqrt{2}-1$$

$$\frac{7}{16} \ln(3+2\sqrt{2}) - 4 \ln(\sqrt{2}+1) = \frac{7}{16} \ln((1+\sqrt{2})^2) - 4 \ln(\sqrt{2}+1) = \frac{14}{16} \ln(1+\sqrt{2}) - 4 \ln(\sqrt{2}+1) =$$

$$-\ln(\sqrt{2}-1) \left(\frac{7}{8} - \frac{32}{8} \right) = \frac{25}{8} \ln(\sqrt{2}-1)$$

Exercice 28

$$\ln y = \ln(12\sqrt{2}+17) \text{ donc } y = 12\sqrt{2}+17$$

Exercice 29

$$A = 0; \quad B = 0$$

Exercice 30

$$e^{3 \ln 2} = e^{\ln 2^3} = 8; \quad \ln(\sqrt{e}) = \frac{1}{2}; \quad \ln(e^{\frac{1}{3}}) = \frac{1}{3}; \quad e^{-2 \ln 3} = \frac{1}{9}; \quad \ln(e^{-\frac{1}{2}}) = -\frac{1}{2}; \quad \ln(^5\sqrt{e}) = \frac{1}{5}$$

Exercice 31

$$a = \frac{3}{2} \quad b = 2 \quad c = \frac{1}{\ln 2} \quad d = -17 \quad f = 1 \quad g = -1 \quad h = e$$

Exercice 32

Soit $x \in \mathbb{R}$. On a $-x-5 > 0$ et $x-61 > 0$ et $x+7 > 0 \iff x < -5$ et $x > 61$ et $x > -7$. Or, $] -\infty, -5[\cap] 61, +\infty[= \emptyset$. On déduit que (1) n'a aucune solution.

On a $-x-5 > 0$ et $\frac{x-61}{x+7} > 0 \iff x < -5$ et $(x-61)(x+7) > 0 \iff x < -5$ et $x \in] -\infty, -7[\cup] 61, +\infty[\iff x \in] -\infty, -7[$.

Soit $x \in] -\infty, -7[$. On a (2) $\iff \frac{x-61}{x+7} = -x-5 \iff x-61 = (-x-5)(x+7) \iff x^2+13x-26 = 0 \iff x = \frac{\sqrt{273}-13}{2}$ ou $x = \frac{-\sqrt{273}-13}{2}$. On pose $x_1 = \frac{\sqrt{273}-13}{2}$ et $x_2 = \frac{-\sqrt{273}-13}{2}$. On a $x_1 < -7 \iff \sqrt{273} < -1$ cette dernière inégalité est impossible donc $x_1 \geq -7$ donc x_1 est exclue.

On a $x_2 < -7 \iff -\sqrt{273} < -1 \iff \sqrt{273} > 1$ (*). (*) est vraie donc $x_2 < -7$ (2) a donc comme ensemble de solution $\left\{\frac{-\sqrt{273}-13}{2}\right\}$.

Remarque : Notez bien l'utilisation de l'expression "On pose" pour donner un nom à des quantités, expressions connues ainsi que l'utilisation de (*) pour nommer, en référence, une égalité — ce peut être aussi une inégalité. Ces outils rédactionnels sont bien utiles pour alléger la rédaction.

Exercice 33

inéquation 1 : $x \geq \frac{(\ln 12+5)}{3}$

inéquation 2 : $x \in [0; 1]$

inéquation 3 : $x \geq \frac{2}{e}$

inéquation 4 : $x \geq -\frac{1}{12}$

Exercice 34

(1) $x = \frac{4}{3}$ (2) $x = 5$ (3) $x = -14,5$ (4) $x = \frac{3\sqrt{3} + 2\sqrt{2}}{5}$.

Exercice 35

(1) $x = 2$ (2) $x = -\frac{113}{43}$ (3) $x = \frac{-21}{5}$ (4) $x = 0$.

Exercice 36

(1) $x \in \{1; 2; 3\}$ (2) $x \in \{0; -\frac{1}{5}; \frac{3}{4}; \frac{4}{3}\}$ (3) $x \in \{-1; 1\}$ (4) $x \in \{-5; \frac{6}{5}\}$ (5) $x \in \{-\frac{7}{2}; \frac{7}{2}\}$

(6) $x \in \{\frac{13}{2}; \frac{19}{5}\}$ (7) $x \in \{-2; 0; 2\}$ (8) $x \in \{-\frac{1}{3}; 2; \frac{8}{3}\}$

Exercice 37

a) $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}$ b) 8, 2 c) $\sqrt{2}, \sqrt{8}$ d) 2, a e) -1, $-\pi$ f) $4 - \sqrt{22}, 4 + \sqrt{22}$ g) $-\frac{1}{4}, -\frac{1}{2}$
h) 0, 6

i) $-2\sqrt{\frac{2}{3}}, 2\sqrt{\frac{2}{3}}$ j) $\frac{-1 - \sqrt{5}}{26}, \frac{-1 + \sqrt{5}}{26}$ k) $-3a, -a$ l) $-\frac{5}{2}\sqrt{\frac{5}{3}}, \frac{5}{2}\sqrt{\frac{5}{3}}$ m) $\frac{1}{6}, 1$.

Exercice 38

Première équation : $\frac{10}{7}$ et 5, deuxième équation : ± 7 , troisième équation : 0 et $\frac{1}{3}$ et dernière équation : -1 et -7.

Exercice 39

on a pour ensemble de solution pour (1) $\{2\}$, pour (2), \emptyset et pour (3) $\{-\frac{7}{4}\}$.

Exercice 40

$x \in]\frac{1}{3}; 5[$, $x \in]-3; \frac{5}{2}[$ et $x \in [-\frac{1}{2}; 5[$.

Exercice 41

Dans l'ordre :

- Toujours vrai
- Toujours vrai
- $]\frac{1}{2}; 1[\cup]2; +\infty[$
- $]0; \frac{7-\sqrt{17}}{2}[\cup]2; \frac{7+\sqrt{17}}{2}[$
- $] -\infty; 3[\cup]4; +\infty[$
- $[1; 2] \cup [4; 7]$
- $[2; 5] \cup [9; 12]$
- $]1; +\infty[$

Exercice 42

Dans l'ordre :

- $[0, 1[$ (on peut par exemple poser $X = \sqrt{x}$ et bien tenir compte que x doit être positif)
- $[-4; \frac{-1+\sqrt{13}}{2}[$ (ici il faut distinguer les cas où $x + 1 < 0$, auquel cas l'inégalité est vraie, et le cas où $x + 1 \geq 0$ et en ce cas on peut élever au carré, en tenant compte bien sûr aussi que $x \geq -4$.)
- Pas de solution. (bien examiner toutes les contraintes sur $x : x^2 - x \geq 0, x - 3 \geq 0...$)

Exercice 43

On trouve comme solutions réelles $\pm\sqrt{5}$.

Exercice 44

Pour la première, $\ln x = -6$ ou $\ln x = 7$ soit $x = e^{-6}$ ou $x = e^7$. Pour la seconde, $x = e^{\sqrt{7}}$ ou $x = e^{-\sqrt{7}}$.

Exercice 45

$$(1) -1 \leq x \leq 7 \quad (2) x \leq -3 \text{ ou } x \geq 2 \quad (3) \mathbb{R} \quad (4) x \leq -4 \text{ ou } x \geq -\frac{2}{3} \quad (5) -2 \leq x \leq 5.$$

Exercice 46

On peut déjà simplifier l'expression avec les propriétés du logarithme et de la valeur absolue :

$$f(x) = xe^{|\ln|x||}$$

Si $x \in [-1; 1]$, alors le logarithme est négatif et $f(x) = xe^{-\ln|x|} = \frac{x}{|x|} = \pm 1$ selon le signe de x .

Si $|x| > 1$, alors le logarithme est positif, et $f(x) = xe^{\ln|x|} = x \times |x|$. On peut alors détailler les cas plus précisément :

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x > 1 \\ 1 & \text{si } 0 < x \leq 1 \\ -1 & \text{si } -1 \leq x < 0 \\ -x^2 & \text{si } x < -1 \end{cases}$$

Exercice 47

$$\begin{aligned} S_{(1)} &= \{k\pi; k \in \mathbb{Z}\} \cup \left\{\frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}; k \in \mathbb{Z}\right\} \\ S_{(2)} &= \left\{\frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{5}; k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{-\frac{5\pi}{6} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\right\} \\ S_{(3)} &= \left\{\frac{2\pi}{3} + k\frac{4\pi}{3}; k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{\frac{2\pi}{5} + k\frac{4\pi}{5}; k \in \mathbb{Z}\right\} \\ S_{(4)} &= \left\{\frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}; k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{\frac{\pi}{10} + k\pi; k \in \mathbb{Z}\right\} \\ S_{(5)} &= \left\{\frac{5\pi}{24} + \frac{5k\pi}{6}; k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{\frac{5\pi}{4} + 5k\pi; k \in \mathbb{Z}\right\} \\ S_{(6)} &= \left\{\frac{\pi}{22} + \frac{2k\pi}{11}; k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{\frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3}; k \in \mathbb{Z}\right\} \\ S_{(7)} &= \{\pi + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\} \cup \left\{\frac{\pi}{3} + \frac{2k\pi}{3}; k \in \mathbb{Z}\right\} \\ S_{(8)} &= \left\{\frac{\pi}{2} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{-\frac{\pi}{10} + \frac{2k\pi}{5}; k \in \mathbb{Z}\right\} \end{aligned}$$

Exercice 48

Soit $x \in \mathbb{R}$. $\sin(x) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ équivaut à $x \in \{-\frac{\pi}{4} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$ ou $x \in \{-\frac{3\pi}{4} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$. On cherche les solutions comprises entre π et 2π ce qui revient à effectuer une recherche sur les entiers k possibles pour les deux ensembles. Cela correspond donc à $x = \frac{5\pi}{4}$ ou $x = \frac{7\pi}{4}$. Pour le deuxième système on obtient une seule solution : $\frac{2\pi}{3}$.

Exercice 49

$$\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}; \quad \sin\left(\frac{5\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}.$$

Exercice 50

$$\frac{\sin(2a)}{\sin(a)} - \frac{\cos(2a)}{\cos(a)} = \frac{1}{\cos(a)} \text{ pour } a \notin \left\{k\frac{\pi}{2}; k \in \mathbb{Z}\right\}.$$

Exercice 51

Exercice 52

$$\begin{aligned} a &= 24 + 7i & b &= 8 - 6i & c &= 7 & d &= 1 - i & e &= \frac{3+i\sqrt{2}}{11} & f &= -\frac{1+i\sqrt{2}}{3} \\ g &= -\frac{4+19i}{13} & h &= 3i & k &= \frac{12+9i}{25} & l &= \frac{8+i}{5} & m &= \frac{9+23i}{10}. \end{aligned}$$

Exercice 53

$$\begin{aligned} (1) &\iff z = 1 - 3 * I & (2) &\iff z = \frac{3+i}{4} & (3) &\iff z \in \left\{-\frac{1}{2}, 2 + i\right\} & (4) &\iff z = \frac{-40+10i}{17} \\ (5) &\iff z = \frac{2+i}{2} & (6) &\iff z \in \left\{-1 - i, \frac{-1+2i}{2}\right\} & (7) &\iff z = \frac{8-4i}{3} & (8) &\iff z = \frac{8-4i}{3} \end{aligned}$$

Exercice 54

$$\begin{aligned} a &= 1, b = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}, c = 1, d = -1, f = 1, g = -i = e^{\frac{3i\pi}{2}}. \\ h &= -i, j = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{-\frac{2i\pi}{3}}, k = -\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2} = e^{\frac{3i\pi}{4}}, l = e^{-\frac{i\pi}{6}}, m = e^{\frac{5i\pi}{4}}. \end{aligned}$$

Exercice 55

Dans l'ordre : $\lim_{x \rightarrow +\infty} a(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} b(x) = \frac{1}{4}, \lim_{x \rightarrow +\infty} c(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} d(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} e(x) = 0,$
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty.$

Exercice 56

Les solutions sont les suivantes : $\lim_{x \rightarrow +\infty} g_1(x) = -1, \lim_{x \rightarrow +\infty} g_2(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} g_3(x) = -1, \lim_{x \rightarrow +\infty} g_4(x) = \frac{1}{2}, \lim_{x \rightarrow +\infty} g_5(x) = 2.$

Exercice 57

On a dans l'ordre $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_1(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_2(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_3(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_4(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_5(x) = \frac{1}{2}$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_6(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_7(x) = \frac{1}{2}$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_8(x) = 0$

Exercice 58

Les 4 premières sont dérivables sur \mathbb{R}^* et

$$f' : x \mapsto \frac{-1}{x^2} \quad ; \quad f' : x \mapsto \frac{-2}{x^3} \quad ; \quad f' : x \mapsto \frac{-3}{x^4} \quad ; \quad f' : x \mapsto \frac{-4}{x^5}.$$

Les 4 suivantes sont dérivables sur $R \setminus \{1\}$ et

$$f' : x \mapsto \frac{1}{(1-x)^2} \quad ; \quad f' : x \mapsto \frac{2}{(1-x)^3} \quad ; \quad f' : x \mapsto \frac{3}{(1-x)^4} \quad ; \quad f' : x \mapsto \frac{4}{(1-x)^5}$$

Les 4 dernières sont dérivables sur $R \setminus \{-\frac{1}{2}\}$ et

$$f' : x \mapsto \frac{-2}{(2x+1)^2} \quad ; \quad f' : x \mapsto \frac{-4}{(2x+1)^3} \quad ; \quad f' : x \mapsto \frac{-6}{(2x+1)^4} \quad ; \quad f' : x \mapsto \frac{-8}{(2x+1)^5}$$

Exercice 59

$$f'_1 : x \mapsto 3(x-1)^2;$$

$$f'_2 : x \mapsto 6x(x^2-1)^2;$$

$$f'_3 : x \mapsto 6(x-1);$$

$$f'_4 : x \mapsto 2x-3;$$

$$f'_5 : x \mapsto \frac{2}{(x+3)^2};$$

$$f'_6 : x \mapsto -\frac{5}{(2+x)^2};$$

$$f'_7 : x \mapsto \frac{4}{(1-x)^2};$$

$$f'_8 : x \mapsto \frac{6x^3+1}{x^2};$$

$$f'_9 : x \mapsto 3x^2-6x-10;$$

$$g'_1 : x \mapsto -3\frac{x^2-4x+1}{(x-2)^2};$$

$$g'_2 : x \mapsto \frac{-x^2+6x-1}{(x^2-x+2)^2};$$

$$g'_3 : x \mapsto \frac{1}{\sqrt{2x-3}};$$

$$g'_4 : x \mapsto \frac{x-1}{\sqrt{x^2-2x+5}};$$

$$g'_5 : x \mapsto \frac{x}{\sqrt{x^2+1}};$$

$$g'_6 : x \mapsto \frac{1}{(-x+2)^2};$$

$$g'_7 : x \mapsto -2\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right);$$

$$g'_8 : x \mapsto -2\cos\left(2x-\frac{\pi}{6}\right);$$

$$g'_9 : x \mapsto 2\cos(2x)\cos(x)-\sin(2x)\sin(x);$$

$$h'_1 : x \mapsto -6\sin(x)(2\cos(x)-1);$$

$$h'_2 : x \mapsto \frac{-\sin^3(x)}{(1+\cos^2 x)^2};$$

$$h'_3 : x \mapsto 4\cos^2(x)+\cos(x)-\sin(x)-2$$

$$h'_4 : x \mapsto \frac{-x^2}{x^2\cos^2(x)-2x\sin(x)\cos(x)-x^2-\cos(x)^2};$$

$$h'_5 : x \mapsto \frac{5}{5x-1};$$

$$h'_6 : x \mapsto \frac{2x}{x^2+1}$$

$$h'_7 : x \mapsto \frac{2}{(x-1)(x+1)};$$

$$h'_8 : x \mapsto \frac{1}{x\ln x};$$

$$h'_9 : x \mapsto \frac{-2}{7-2x}$$

$$u'_1 : x \mapsto \ln x;$$

$$u'_2 : x \mapsto 3e^{3x};$$

$$u'_3 : x \mapsto (2x-1)e^{x^2-x+1}$$

$$u'_4 : x \mapsto \cos x e^{\sin(x)};$$

$$u'_5 : x \mapsto \frac{2e^x}{(e^x+1)^2};$$

$$u'_6 : x \mapsto (1+\ln x)e^{x\ln(x)}$$

$$u'_7 : x \mapsto \frac{x-1}{x}e^{\frac{1}{x}};$$

$$u'_8 : x \mapsto \frac{2e^{2x}-e^x}{e^{2x}-e^x+1};$$

$$u'_9 : x \mapsto \frac{1+e^{-x}+xe^{-x}}{(1+e^{-x})^2}$$

$$v'_1 : x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)^2};$$

$$v'_2 : x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x-1}(x+1)^{\frac{3}{2}}};$$

$$v'_3 : x \mapsto \frac{\cos x}{\sqrt{1+\sin(x)}(1-\sin(x))^{\frac{3}{2}}};$$

$$v'_4 : x \mapsto \frac{2}{\cos^2 2x}$$

Exercice 60

$x \mapsto \ln(-x) + C$; $C \in \mathbb{R}$.

Exercice 61

A une constante additive près on trouve :

$$\text{Sur } \mathbb{R}, F : x \mapsto \frac{1}{17}x^{17} - \frac{5}{2}x^{14} + \frac{7}{6}x^{12} - \frac{1}{3}x^9 + 4x^5 + 14x^4 + 17x^3 + 9x^2 + x;$$

$$\begin{array}{llll}
F_1 : x \mapsto \ln|x|; & F_2 : x \mapsto \frac{-1}{x}; & F_3 : x \mapsto \frac{-1}{2x^2} & F_4 : x \mapsto \frac{-1}{3x^3}; \\
G_1 : x \mapsto -\ln|1-x|; & G_2 : x \mapsto \frac{1}{(1-x)}; & G_3 : x \mapsto \frac{1}{2(1-x)^2} & G_4 : x \mapsto \frac{1}{3(1-x)^3}; \\
H_1 : x \mapsto \frac{1}{2}\ln|2x+1|; & H_2 : x \mapsto \frac{-1}{2(2x+1)}; & H_3 : x \mapsto \frac{-1}{4(2x+1)^2} & H_4 : x \mapsto \frac{-1}{6(2x+1)^3};
\end{array}$$

Exercice 62

$$\begin{array}{lll}
a)x \mapsto \frac{4}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 - \frac{1}{x}; & b)x \mapsto \frac{1}{20}(2x^2 + 1)^5; & c)x \mapsto \frac{1}{4}(x-1)^4 \\
d)x \mapsto \frac{1}{7}x^7 - \frac{3}{5}x^5 + x^3 - x; & e)x \mapsto -\frac{1}{x} - 2\sqrt{x}; & f)x \mapsto \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + x; \\
g)x \mapsto -\frac{1}{2}\cos 2x & h)x \mapsto \frac{1}{3}\sin 3x; & i)x \mapsto x - \tan x; \\
j)x \mapsto \frac{1}{2}\ln|x^2 + 2x|; & k)x \mapsto \frac{1}{6}(x^2 - 1)^6 & l)x \mapsto -\frac{1}{2}\frac{1}{(x^2 + 2)}; \\
m)x \mapsto \ln|x-3|; & n)x \mapsto -\frac{1}{x^2 + x + 3}; & o)x \mapsto \frac{1}{3}\ln|x^3 - 1| \\
p)x \mapsto \frac{1}{2}e^{2x}; & q)x \mapsto \frac{1}{5}\ln(5e^x + 1); & r)x \mapsto \frac{3}{8}(1 + e^{2x})^{\frac{4}{3}}; \\
s)x \mapsto -\ln|\cos x| & t)\frac{1}{2}e^{x^2}; & u)x \mapsto 2e^{\sqrt{x}}; \\
v)x \mapsto \frac{15}{2}x^{\frac{2}{3}}; & w)x \mapsto -\frac{2}{3}\frac{1}{x^{\frac{3}{2}}} & x) - 2\sqrt{e^x}; \\
y)x \mapsto \ln(1 + e^x); & z)x \mapsto -e^{\cos x} & \alpha)x \mapsto -\frac{3}{2}\frac{1}{x^{\frac{2}{3}}} \\
\beta) - \frac{1}{\sqrt{1 + 2e^x}}; & \gamma)x \mapsto \ln|\cos x + \sin x|. &
\end{array}$$

Exercice 63

$$I1 = \ln 2; I2 = \frac{1}{2}(1 - e^{-2}); I3 = \frac{3}{2}\ln 10; I4 = 2\ln \frac{63}{55}; I5 = 0$$